

## Kuollut hirvieläin – hirvieläinten näivetystauti

Jos löydät maastosta itsestään kuolleen hirvieläimen, ota yhteyttä eläinlääkäriin. Eläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Ruokavirastoon. Sairaista, vahingoittuneista ja poikkeavasti käyttäytyvistä hirvieläimistä ilmoitetaan poliisille tai alueelliselle riistakeskukselle.

Hirvieläinten näivetystauti eli chronic wasting disease, CWD, ei tiedettävästi tartu ihmiseen. CWD ja muut TSE-taudit hirvieläimillä kuuluvat samaan aivotautiryhmään kuin hullun lehmän tauti. Vuonna 2016 Norjassa todettiin Euroopan ensimmäiset CWD-tapaukset. Suomessa todettiin ensimmäinen hirvieläinten TSE tautitapaus helmikuussa 2018 ja Ruotsissa 2019. Norjan löydösten seurauksena taudin seurantaohjelma aloitettiin Suomessa ja viidessä muussa EU-maassa. Suomessa on tavoitteena tutkia noin 3 000 hirvieläintä vuosina 2018-2020.

CWD etenee hitaasti. Eläin laihtuu ja kuihtuu, vaikka se söisi. Taudin loppuvaiheessa alkaa ilmentyä aivoperäisiä oireita: eläin vetäytyy muista, on haluton, painaa päätä alas, toistaa tiettyjä liikkeitä tai vaikuttaa hermostuneelta. Eläin voi juoda ja kuolata epänormaalin paljon.